

Patient:

Patient:

Einverständniserklärung zu einem operativen Eingriff

Einverständniserklärung zu einem operativen Eingriff

Einverständniserklärung Operativer Eingriff

geplanter Eingriff:

mögliche Komplikationen:

- Schmerzen
- Schwellung
- Nachblutung
- Entzündung
- Nervschädigung
- Schädigung der Nachbarzähne
- Eröffnung der Kieferhöhle
- _____

Ich wurde ausführlich und ausreichend über den bei mir geplanten Eingriff informiert.

Sämtliche bei diesem Eingriff möglichen Komplikationen sind mit mir besprochen worden.

Mögliche Alternativen zu diesem Eingriff sind mir bekannt.

Ich hatte ausreichend Zeit mich über den geplanten Eingriff zu informieren.

Unterschrift Arzt

Unterschrift Patient

Ort/Datum

geplanter Eingriff:

mögliche Komplikationen:

- Schmerzen
- Schwellung
- Nachblutung
- Entzündung
- Nervschädigung
- Schädigung der Nachbarzähne
- Eröffnung der Kieferhöhle
- _____

Ich wurde ausführlich und ausreichend über den bei mir geplanten Eingriff informiert.

Sämtliche bei diesem Eingriff möglichen Komplikationen sind mit mir besprochen worden.


Mögliche Alternativen zu diesem Eingriff sind mir bekannt.

Ich hatte ausreichend Zeit mich über den geplanten Eingriff zu informieren.

Unterschrift Arzt

Unterschrift Patient

Ort/Datum



Verhaltensmaßregeln nach einem operativen Eingriff

Zahnarztpraxis in der Wensch • Roland Stich • Fichtenweg 4 • 57078 Siegen
Telefon 0271-870031 • Fax 0271-8708538 • www.roland-stich.de • info@roland-stich.de

Was Sie als Patient nach einem operativen Eingriff beachten sollten:

1. Essen Sie erst etwas, wenn die Anästhesie abgeklungen ist.
2. Spülen Sie nach dem Essen den Mund mit einer ggf. verordneten Spüllösung aus. Ansonsten heilt eine Wunde am besten, wenn man sie in Ruhe lässt.
3. Vermeiden Sie Kaffee, Tee (Schwarztee), Alkohol, Hitze (Sauna, Sonnenbad) und größere körperliche Anstrengungen während der nächsten 1-2 Tage.
4. Rauchen Sie nicht! Nikotin verzögert und stört die Wundheilung!
5. Eine geringe Nachblutung aus der Wunde ist normal.
6. Kühlen Sie nur die ersten Stunden nach dem Eingriff. Den Kühlbeutel nicht länger als 1-2 Minuten auf einer Stelle belassen, damit die Unterkühlung nicht zu einer Durchblutungsstörung führt. Am besten mit kurzen Unterbrechungen kühlen.
7. Sitzen Sie nach dem Eingriff möglichst aufrecht - die normal auftretende Schwellung wird so geringer sein.
8. Verzichten Sie möglichst in den ersten Tagen auf Frischmilchprodukte mit Bakterienkulturen (z.B. Joghurt). Die darin enthaltenen Milchsäurebakterien können zu Wundheilungsstörungen führen.
9. Sollten Sie wider Erwarten starke Beschwerden bekommen, rufen Sie uns bitte an, oder gehen Sie zum Notdienst.

Unser Praxisteam wünscht Ihnen eine gute Genesung!